

Unsere Zwischenfrucht- mischungen im Überblick

	Empfohlen für	Zusammen- setzung	Mischungsportrait	Aussaat- empfeh- lung	Saat- zeit	Legumino- senanteil Samen
VR PLUS Kruziferenfrei	Rapsfrucht- folgen	• Phacelia • Ramtillkraut • Michelsklee	• Sicher abfrierende Zwischenfrucht • Kruziferenfrei und damit besonders in Rapsfruchtfolgen geeignet • Phacelia sorgt für eine top Bodenstruktur • Enges C/N Verhältnis für einen optimalen Nährstoff-Transfer • Besonders geeignet vor Mais oder Sommergetreide	8 kg/ha	bis Ende August	29 %
VR PLUS Kartoffelfit	Kartoffel-, Rüben- und Getreide- fruchtfolgen	• Ölrettich „Nema 2“ • Öllein • Ramtillkraut	• Spezialmischung für den Kartoffelanbau • Nematodenresistenter Ölrettich, damit auch in Zuckerrübenfruchtfolgen geeignet • Leguminosenfreie Mischung • Für einen sicheren Anbauerfolg ist eine Herbstdüngung zu empfehlen	17 – 22 kg/ha	bis Ende August	0 %
VR PLUS Red Area	Kartoffel- und Rüben- fruchtfolgen	• Ölrettich „Nema 2“ • Sommerwicke • Rauhafer	• Universelle Zwischenfrucht für den Anbau vor Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln • N-Fixierung durch die Sommerwicke • Bekämpfung von freilebenden Nematoden durch den Rauhafer • Nematodenresistenter Ölrettich für einen sicheren Anbauerfolg von Zuckerrüben	50 kg/ha	bis Ende August	20 %
VR PLUS Wicki plus N 25	Kartoffel- und Rüben- fruchtfolgen	• Ölrettich „Nema 2“ • Sommerwicke	• Die ideale Mischung vor Kartoffeln und Zuckerrüben in „grünen Gebieten“ • Nematodenresistenter Ölrettich • Sommerwicke bindet zusätzlichen Stickstoff und sorgt für ein enges C/N Verhältnis • Herbstdüngung in voller Höhe möglich, da < 25 % Leguminosen Anteil • Auch ideal als Zwischenfrucht für Mais geeignet, wenn kein Raps in der Fruchtfolge ist	50 kg/ha	bis Ende August	25 %
VR PLUS Wicki plus N 49	Kartoffel- und Rüben- fruchtfolgen	• Ölrettich „Nema 2“ • Sommerwicke	• Die ideale Mischung vor Kartoffeln und Zuckerrüben in „roten Gebieten“ • Nematodenresistenter Ölrettich • Sommerwicke bindet Stickstoff und ersetzt die fehlende Herbstdüngung • Enges C/N-Verhältnis sorgt für einen optimalen Nährstofftransfer • In „grünen Gebieten“ ist eine reduzierte Herbstdüngung möglich, da Leguminosen-anteil <50% • Auch ideal als Zwischenfrucht für Mais geeignet, wenn kein Raps in der Fruchtfolge ist	80 kg/ha	bis Ende August	49 %

Für alle Mischungen empfehlen wir eine Drillsaat. Preis zzgl. 7 % MwSt.

Gebinde: 25 kg oder 500 kg Big-Bags auf Anfrage. Öko-Mischungen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.



Bei Fragen wenden Sie sich gern an Ihren Berater im KundenDialogCenter:
Tel. 05841 949-2200 oder per E-Mail unter kdc@vr-plus-ware.de

Sie erreichen unser KundenDialogCenter
Montag – Freitag: 08.00 –16.30 Uhr

www.vr-plus.de



VR PLUS
Wir kümmern uns